

农作物病虫害情报

第十五期

(2022年9月29日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻破口期病虫害防治意见

据我中心9月26-29日到长沙、水口、月山、塘口、苍城、马冈、蚬冈、赤水等镇(街)调查发现,我市晚稻即将进入破口期,南部四镇水稻已进入齐穗期,个别复耕地水稻尚未进入封行期。当前我市晚稻重点防治**稻纵卷叶螟**,主要为害迟种植田块,达偏重发生程度。

一、稻纵卷叶螟,属中等、局部偏重发生。调查点卷叶率如下:长沙街道办民强村1%-5%,水口镇黎村村>20%,月山镇月明村1%-5%,塘口镇魁草村5%-10%,苍城镇潭碧村10%-20%,马冈镇上郭村<0.5%,蚬冈镇蚬北村一般田块0.5%、迟的达20%,赤水和安村<0.5%。水稻生育期参差不齐,形成较多桥梁田。田间虫态以高龄虫和蛹为主,低龄幼虫占20%,发现零星成虫。迟种植、卷叶率>5%的田块应立即施药,10天左右再施药1次。

二、稻飞虱,总体属偏轻发生,个别重发生。调查点百丛虫量如下:长沙街道办民强村、水口镇黎村村、月山镇月明村、塘口镇魁草村、马冈镇上郭村、赤水和安村<500头,苍城镇潭碧村700-1500头,蚬冈镇蚬北村500-1000头。百丛虫量达1500头的田块应立即施

药，其它田块结合防治稻纵卷叶螟及破口期施药。

三、纹枯病，属偏轻发生。调查点病丛率如下：长沙街道办民强村 5%，水口镇黎村村 8%，月山镇月明村 5%，塘口镇魁草村 5%，苍城镇潭碧村 8%，马冈镇上郭村 5%，蚩冈镇蚩北村 5%-20%，赤水镇和安村 5%。病丛率达 20%的田块应立即施药，其它田块结合防治稻纵卷叶螟及破口期施药。

四、钻蛀性螟虫、细菌性条斑病、胡麻叶斑病、稻瘟病等病虫害零星发生。稻瘟病发病田块及历史稻瘟病区做好稻瘟病预防工作。

五、防治意见

本次防治以稻纵卷叶螟为主，挑治稻飞虱、纹枯病，做好稻瘟病预防工作。重点防治迟种植田块，应抢晴立即施药 1 次，10 天左右再施药 1 次，其它田块根据生育期于破口期或齐穗期施药。推荐药剂及亩用量如下：

1. 防治**稻纵卷叶螟**，使用 20%四唑虫酰胺 10 克、10%四氯虫酰胺 20 克、或 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升。

2. 防治稻飞虱，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克。

3. 防治纹枯病，使用 19%啶氧·丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

4. 防治稻瘟病，使用 75%三环唑可湿性粉剂 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升。

如常规喷施，亩药剂兑水 50 公斤以上；如无人机施药，亩药剂兑水 1.5 公斤以上，用药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。

如遇重大作物疫情，及时上报市农业综合服务中心。